

Durée : 4 heures.

OBLIGATOIRE

Les calculatrices sont autorisées.

Le sujet est composé de quatre exercices indépendants. La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies.


Exercice 1 (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère une fonction f dérivable sur l'intervalle $[-3; 2]$.

On dispose des informations suivantes :

- $f(0) = -1$.
- la dérivée f' de la fonction f admet la courbe représentative C ci-dessous.



Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse.

1. Pour tout réel x de l'intervalle $[-3; -1]$, $f'(x) \leq 0$.
2. La fonction f est croissante sur l'intervalle $[-1; 2]$.
3. Pour tout réel x de l'intervalle $[-3; 2]$, $f(x) \geq -1$.
4. Soit C la courbe représentative de la fonction f .

La tangente à la courbe C au point d'abscisse 0 passe par le point de coordonnées $(1; 0)$.

Exercice 2 (4 points)

Partie A - VRAI OU FAUX

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse donnée (0,5 point par bonne réponse et 0 sinon).

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x \cos x$ et représentée par Cf dans un repère d'origine O .

1. f est 2π -périodique.
2. Cf est symétrique par rapport à O .
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - x f'(x) = x^2 \sin x$.
4. La tangente Cf en O a pour équation $y = x$.

Partie B - QCM

Pour chaque proposition, 4 réponses sont proposées : une seule est exacte.

Donner une seule réponse sans justification (0,5 point par bonne réponse et 0 sinon).

1. Le nombre complexe $(1 + i)^{72}$ est égal à :

a. 2^{72}	b. $6,9 \times 10^{10}$	c. 2^{36}	d. 0
-------------	-------------------------	-------------	------

2. Le nombre complexe $\frac{1+i}{1-2i}$ est égal à :

a. $-\frac{1}{2}$	b. $1 - 3i$	c. $3 - i$	d. $-\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$
-------------------	-------------	------------	----------------------------------

3. La solution de l'équation $2iz + 1 = 2 - i$ est :

a. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$	b. $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$	c. $-\frac{1}{3}i$	d. $-1 + i$
----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------

4. La solution de l'équation $z + 2i\bar{z} = 2 - 5i$ est :

a. 1	b. $\frac{8}{3} - \frac{1}{3}i$	c. $2 - \frac{5}{2}i$	d. $-4 + 3i$
------	---------------------------------	-----------------------	--------------

Exercice 3 (4 points) Cet exercice ne concerne pas les élèves qui suivent la spécialité


Pour embaucher ses cadres une entreprise fait appel à un cabinet de recrutement. La procédure retenue est la suivante : le cabinet effectue une première sélection de candidats sur dossier ; 40 % des dossiers reçus sont validés et transmis à l'entreprise. Les candidats ainsi sélectionnés passent un premier entretien à l'issue duquel 70 % d'entre eux sont retenus. Ces derniers sont convoqués à un ultime entretien avec le directeur des ressources humaines qui recrutera 25 % des candidats rencontrés.

1. On choisit au hasard le dossier d'un candidat.

On considère les événements suivants :

- D : « Le candidat est retenu sur dossier »,
- E_1 : « Le candidat est retenu à l'issue du premier entretien »,
- E_2 : « Le candidat est recruté ».

a. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



b. Calculer la probabilité de l'évènement E_1 .

c. On note F l'évènement « Le candidat n'est pas recruté ».

Démontrer que la probabilité de l'évènement F est égale à 0,93.

2. Cinq amis postulent à un emploi de cadre dans cette entreprise. Les études de leur dossier sont faites indépendamment les unes des autres.

On admet que la probabilité que chacun d'eux soit recruté est égale à 0,07.

On désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes recrutées parmi ces cinq candidats.

a. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

b. Calculer la probabilité que deux exactement des cinq amis soient recrutés. On arrondira à 10^{-3} .

3. On cherche le nombre minimum de dossiers que le cabinet de recrutement doit traiter pour que la probabilité d'embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0,999.

a. Montrer que ce problème équivaut à résoudre l'inéquation $0,001 - 0,93^n > 0$ où n est un entier naturel.

b. Proposer une méthode permettant d'obtenir une valeur approchée de n .

Exercice 4 (8 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et telle que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$.

Le but de cet exercice est de déterminer la limite de la suite u par deux méthodes différentes.

I. Méthode n°1 – Utilisation d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$ par $f(x) = \frac{3x}{1+2x}$.

1. (a) Justifier que la fonction f est dérivable sur son ensemble de définition puis calculer $f'(x)$.

En déduire les variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$.

(b) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition puis interpréter graphiquement les résultats obtenus s'il y a lieu.

(c) Dresser le tableau de variation de f .

(d) Résoudre l'équation $f(x) = x$.

2. On s'intéresse dans cette question aux propriétés de la fonction f sur l'intervalle $\left] -\frac{1}{2}; +\infty \right[$. On a représenté, en annexe, la courbe (C) représentative de f .

(a) Construire, sur le graphique, les points A_0, A_1, A_2 et A_3 d'ordonnée nulle et d'abscisses respectives u_0, u_1, u_2 et u_3 .

Quelles conjectures peut-on faire concernant le sens de variation de (u_n) et sa convergence ?

(b) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.

(c) En déduire que la suite u converge et calculer sa limite.

II. Méthode n°2 – Utilisation d'une suite auxiliaire.

On admet dans cette partie que la suite u est convergente.

Soit (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$

1. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 3.

2. Exprimer pour tout entier naturel n , v_n en fonction de n .

3. En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$.

4. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

III. Etude d'un algorithme

L'algorithme suivant a pour but de déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 1| < m$, où m désigne un réel positif. Cet algorithme est incomplet.

Variation	n est un entier, u et m sont deux réels u prend la valeur 0,5
Initialisation	n prend la valeur 0 Saisir la valeur de m
Traitement	Tant que Fin tant que
Sortie	Afficher n

1. Sur la copie, recopier la partie « Traitement » en la complétant.

2. A l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur que cet algorithme affichera si $m = 0,001$.

Annexe à compléter et à rendre avec la copie

Nom :

Prénom :

Exercice 4

